

麻しん・風しん・水痘・流行性耳下腺炎ワクチンについて

- ・麻しん・風しん・水痘・流行性耳下腺炎のワクチン接種歴(2回)が証明できない場合は、抗体価検査を受けてください
- ・抗体価検査の結果、十分な免疫が確認できな場合は、検査結果に応じて必要なワクチン接種を受けてください

なお、提出時は抗体価検査結果およびワクチン接種証明書(接種した場合)の提出が必要です

疾患名	検査項目	十分な免疫なし（基準に満たさない）		十分な免疫あり
		陰性（-）	不十分（±）	陽性（+）
ワクチン必要回数	—	2回接種必要	1回接種必要	接種不要
麻しん (はしか)	EIA法-IgG	2.0未満	2.0～15.9	16.0以上
風しん (三日はしか)	HI法	8倍未満	8倍 16倍	32倍以上
	EIA法-IgG	2.0未満	2.0～7.9	8.0以上
水痘 (みずぼうそう)	EIA法-IgG	2.0未満	2.0～3.9	4.0以上
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	EIA法-IgG	2.0未満	2.0～3.9	4.0以上

B型肝炎ワクチンについて

- ・ B型肝炎ワクチンの接種歴(1クール：3回)が証明できない場合は、まずHBs抗体検査を受けてください
- ・ 検査の結果、十分な抗体価が確認できない場合は、ワクチン接種を受けてください
- ・ 1クール接種後にHBs抗体価を測定し、十分な抗体価が得られない場合は、2クール目(追加3回)の接種を行ってください
- ・ 2クール(計6回)接種後も抗体価が十分でない場合、2クール分のワクチン接種証明書を提出してください

なお、提出時には抗体価検査結果およびワクチン接種証明書(接種した場合)の提出が必要です

疾患名	検査項目	十分な免疫なし	十分な免疫あり
		陰性 (-)	陽性 (+)
B型肝炎	HBs抗体	10.0未満※	10.0以上

※過去に10.0mIU/ml以上獲得できていれば免疫ありと判断可(その時の検査結果が必要)